

emotralex™

mast za rektalnu upotrebu – Uputstvo za upotrebu



Pažljivo pročitajte Uputstvo za upotrebu jer ono sadrži važne informacije za korisnika. Ovaj proizvod je medicinsko sredstvo namenjeno za odrasle, i treba ga koristiti u skladu sa datim indikacijama radi postizanja maksimalne efikasnosti.

Sačuvajte ovo Uputstvo za upotrebu. Možda ćete želeti ponovo da ga pročitate.

Sastav

Sukralfat, kakao buter, lanolin (biljnog porekla), beli vazelin, beli vosak (pčelinji vosak), prečišćena voda, kaprilil glikol, ekstrakt nevena, ekstrakt kamilice, ekstrakt hamamelisa.

Oblik medicinskog sredstva

Mast za rektalnu upotrebu. Svaka tuba sadrži 25 g masti za rektalnu upotrebu.

Sadržaj kartonske kutije: Jedna tuba i jedan plastični aplikator koji se pričvrsti na tubu.

Šta je emotralex™ rektalna mast i za šta se upotrebljava?

emotralex™ rektalna mast je namenjena za terapiju simptoma povezanih sa hemoroidalnom bolešću i njenim komplikacijama (npr. ekcem, analna fisura). Mast prekriva i štiti epiderm, neguje zapaljenu kožu koja svrbi i na ovaj način pomaže u ubrzavanju regeneracije kože. Smanjuje isušivanje kože, potpomaže zaceljivanje rana, smanjuje rizik od fisura i povreda izazvanih defekacijom.

Kada treba da izbegavate da upotrebljavate emotralex™ rektalnu mast?

Nemojte upotrebljavati ukoliko ste preosetljivi na lanolin ili na bilo koji drugi sastojak ovog proizvoda. Nemojte upotrebljavati za hemoroide koji krvare.

Trudnoća i dojenje

Upotreba **emotralex™** rektalne masti nije kontraindikovana u trudnoći i tokom dojenja, ali se preporučuje da se u ovim slučajevima konsultujete sa Vašim lekarom.

Interakcije sa drugim preparatima

Nije poznata nijedna interakcija **emotralex™** rektalne masti sa drugim preparatima. Stoga, preporučuje se da razgovarate sa svojim lekarom ili farmaceutom pre upotrebe ove rektalne masti istovremeno sa drugim preparatima za rektalnu upotrebu.

Istovremena upotreba rektalne masti sa prezervativom može smanjiti bezbednost kontracepcije.

Kako se koristi emotralex™ rektalna mast?

Uvek upotrebljavajte medicinsko sredstvo kako je opisano u Uputstvu za upotrebu.

Kada se upotrebljava drugačije nego što je to opisano u Uputstvu za upotrebu, može se desiti da simptomi ne budu u potpunosti uklonjeni, ili da se pojavi iritacija.

Operite ruke pre upotrebe **emotralex™** rektalne masti.

Preporučena doza je: Mast treba staviti na periferiju anusa, posle defekacije ili kupanja, ili malu količinu masti (veličine zrna graška) treba staviti u rektum pomoću aplikatora. Proverite da li su tuba i aplikator dobro povezani.



Pre upotrebe proveriti da je pakovanje netaknuto, da je sadržaj kutije potpun i da su i tuba i aplikator neoštećeni. Nemojte koristiti ukoliko je pakovanje, sredstvo ili aplikator oštećen.

Operite aplikator toplom vodom i sapunom i zatvorite tubu zaštitnom kapičicom nakon upotrebe.

Operite ruke uvek nakon upotrebe masti. Preporučuje se upotreba preparata jednom ili dva puta dnevno. Aplikator može da koristi samo jedna osoba.

Proizvod ne treba stavljati u oči ili oko očiju, u usta ili na mukoznu membranu ustiju. Ako proizvod dođe u kontakt sa gorenavedenim delovima tela, obrišite ih ili isperite.

Mast se može izliti na Vaš donji veš, te se stoga preporučuje korišćenje dnevnih uložaka.

Dužina trajanja upotrebe zavisi od toga kako se simptomi poboljšavaju, ali se može upotrebljavati do 4 nedelje bez prekida. Razgovarajte sa Vašim lekarom ukoliko se Vaši simptomi ne poboljšaju kroz 1-2 nedelje.

Moguća neželjena dejstva

Upotreba bilo kog lokalno primenjivanog preparata – naročito duže vreme – može dovesti do reakcija preosetljivosti, do simptoma kao što su osećaj žarenja, svrab, bol, crvenilo. Ukoliko osetite ovakve simptome tokom upotrebe preparata, prekinite terapiju i kontaktirajte Vašeg lekara.

Ukoliko osetite bilo koje drugo neželjeno dejstvo koje nije navedeno u ovom Uputstvu za upotrebu, molimo Vas razgovarajte sa Vašim lekarom ili farmaceutom.

Upozorenja

Držite van domašaja i vidokruga dece! Izbegavajte kontakt sa očima! Nemojte gutati mast!

emotralex™ rektalna mast se ne sme stavljati u vaginu.

Rok upotrebe i uslovi čuvanja

Datum isticanja roka upotrebe je naznačen na kartonskoj kutiji i na tubi. Datum isteka roka upotrebe i serijski broj su naznačeni na tubi na mestu spajanja.

Nemojte koristiti mast nakon isteka roka upotrebe. Rok upotrebe se odnosi na poslednji dan navedenog meseca.

 Nemojte čuvati **emotralex**™ rektalnu mast na temperaturi višoj od 25°C.

 Držite mast dalje od sunčeve svetlosti.

Nemojte bacati medicinsko sredstvo u kanalizaciju ili kućni otpad. Pitajte Vašeg farmaceuta kako da odložite medicinsko sredstvo koje više ne koristite. Ove mere će pomoći u zaštiti životne sredine.


Ovo uputstvo za upotrebu je poslednji put odobreno/revidirano u: Januaru 2020.

Proizvođač:









Egis Pharmaceuticals PLC, Kereszturi ut 30-38., Budimpešta, 1106, Mađarska

Br. Rešenja ALIMS-a:
515-02-03832-19-004

Ovlašćeni predstavnik:

 Servier d.o.o. Milutina Milankovića 11a
11070 Novi Beograd – Beograd

Objašnjenje simbola na pakovanju

	Opres! Pročitajte uputstvo pre upotrebe
	Konsultujte uputstvo za upotrebu
	Nemojte koristiti ukoliko je pakovanje oštećeno
	Temperaturni limit
	Držite dalje od sunčeve svetlosti
	Proizvođač
	Broj serije
	Upotrebiti do


Medicinsko sredstvo